

Bahňáci (Charadriiformes)

Bahňáky jako podřád řadíme do řádu dlouhokřídlých, podtřídy letců, třídy ptáků, kmene strunatců, říše živočichů a nadříše triblastica. Jako podřád se dělí na následující čeledi : písečnickovití, dropíkovití, slukovití, slučicovití, ostnákovití, štítonosovití, dytíkovití, ústříčnickovití, tenkozobcovití, srpátkovití, kulíkovití, pobřežníkovití a ouhorlíkovití

Bahňáci jsou malí až středně velcí a štíhlí ptáci. Mají tenký a dlouhý zobák, v některých případech je ohnutý buď dolu nebo nahoru, který slouží k nalezení a chycení potravy v zamokřené půdě nebo písku. Chybí jim vole. Mají dlouhá křídla, tenké a dlouhé brodivé nohy.

Živí se především drobnými živočichy jako například červy či hmyz. Hnízdí na zemi, především v zamokřených loukách, bahnitých, písčitých a kamenitých březích. U nás se vyskytuje především čejka, kulík, koliha, sluka, bekasina, více druhů vodoušů a jespáků, písík, břehouš a tenkozobec.

Jejich mláďata jsou nekrmivá a většinou se o ně starají oba rodiče. U druhů, kde se o mladé stará samec, je výraznější pohlavní dimorfismus - samice je pestřejší.

Jsou to velice dobří letci, často na zimu táhnou do teplých krajů, kde pak žijí u mořského pobřeží.

Zástupci :

Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) - Velikostí podobná holubovi. Na hlavě má výraznou chocholku. Za letu pomalu mává zaoblenými křídly a často se ozývá kvílivým hlasem. Hnízdí na mokřích loukách v blízkosti rybníků, ale i na oraništích. Za potravu ji slouží hmyz, dešťovky a drobní plži.

Kulík říční (Charadrius dubinus) - Veliký asi jako drozd. Má výraznou černou pásku pod krkem. Pohybuje se rychlým během po zemi. Hnízdí na písčínách řek nebo větších rybníků. Živí se hmyzem, pavouky a červy.

Písík obecný (Actitis hypoleucos) - Velký asi jako špaček. Typický je svým nízkým letem nad hladinou, při kterém rychle a trhavě pohybuje křídly. Žije na březích rybníků a řek, hnízdo si staví na zemi na písčitém nebo kamenitém břehu. Živí se červy a vodním hmyzem.

Sluka lesní (Scolopax rusticola) se zdržuje v listnatých a smíšených lesích a v jejich vlhkých místech. Kropenatá vejce snáší do dolíku pod křovinami.

Bekasina otavní (Gallinago gallinago) žije v celé Evropě kromě jihu. Ročně snáší 4 skvrnitá vejce olivové barvy. Požírá hmyz, pavouky, červy.

Jespák bojovný (Calidris alpina) je rozšířen v severnějších a středních oblastech Evropy a obývá břehy rybníků. Délka těla přes 20 cm. Samice staví hnízdo v důlku, snáší 4 vejce a sedí sama. Samci svádějí mezi sebou souboje, v době hnízdění mají límcovitě prodloužená pera na krku a jsou pestře zbarvení. Jespáci se živí hmyzem, červy, měkkýši a jinou drobnou potravou.